Amniocentese Nadel mit zentimeter Markierung
Amniocentesis needles with centimeter-markings



## **Transabdominale Fruchtwasserentnahme**

(in der Regel zwischen der 15. und 18. Schwangerschaftswoche) vor der Geburt zur Diagnose genetischer Störungen des Fötus. Sie können auch für zytogenetische und werden. ist biochemische Studien verwendet Der Dorn mit einer ultraschalldetektierbare Spitze versehen, die ein echogeführtes Einführen ermöglicht. Die Nadel ist mit einem einstellbaren Stopper zum Fixieren der Einführtiefe versehen und hat einen Luer-Lock-Anschluss zum Sammeln des Fruchtwassers durch eine Spritze.

AMNIOCENT ist in 4 verschiedenen Größen erhältlich. Die Nadeln sind mit einer Zentimeterskala markiert (1 cm Auflösung)\* und haben eine doppelte Kerbe bei 5 cm. \* Es ergibt eine ungefähre Messung

Cod	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
772007	Giallo Yellow	20 G x 120 mm	25 pz./pcs.
772004	Giallo Yellow	20 G x 150 mm	
772006	Giallo Yellow	20 G x 180 mm	
772001	Verde Green	21 G x 150 mm	

